



NEVROLOŠKA ORDINACIJA IN NEVROFIZIOLOŠKI LABORATORIJ

Prof. dr. sc. Miro Denišlić, dr. med.

1000 Ljubljana, Peričeva 7 (Bežigrad)

Tel. (01) 43-616-88

Ime in priimek:	Mr. Alexander Eugene BROWN,	Rojstni datum:	27.6.1946
Naslov	Studeno 108, 6230 Postojna		16.12.2021

ZDRAVNIŠKO POTRDILO

Gospod mr. Alexander Eugene BROWN se zdravi že 8 let zaradi parkinsonove bolezni. Zaradi spinalne stenoze v ledvenem predelu je bil decembra 2020 operiran. Težave s hojo se stopnjujejo in so posledica osnovne bolezni kot tudi degenerativnih sprememb v križu.

Klinično so izraženi znaki bradikineze levice, znaki izrazite kamptokormije in pojav večkratnih blokad med hojo. S stola ustale le s pomočjo rok oz. pomoči. Hodi s pomočjo hojice, močno sključen – kamptokormija.

Gibljivost spodnjih udov med hojo je torej izredno omejena in sposobnost samostojne hoje je zmanjšana vsaj za 80 % - izvedljiva le s pomočjo hojice.

Priporočam, da se gospodu odobri nalepka za parkiranje na prostoru za invalide.

Prof. dr. Miro Denišlić,
specialist nevrolog

Prof. dr. MIRO DENIŠLIĆ
specialist nevrolog



NEVROLOŠKA ORDINACIJA IN NEVROFIZIOLOŠKI LABORATORIJ

Prof. dr. sc. Miro Denišlić, dr. med.

1000 Ljubljana, Peričeva 7 (Bežigrad)

Tel. (01) 43-616-88

Ime in priimek:	Mr. Alexander Eugene BROWN,	Rojstni datum:	27.6.1946
Prihaja zaradi:	parkinsonova bolezen - kontrola	Datum:	08.12.2021
Naslov	Studeno 108, 6230 Postojna		

Kot je znano je bil gospod decembra 2020 operiran zaradi spinalne stenoze. Operativni poseg ni izboljšal telesne drže s pomočjo hodulje s kolesi hodi zelo dobro, vendar zelo sključeno. Prenehal je jemati Azilect – oteklina stopali in goleni je popolnoma splahnela. Trenutno prejema Mirapexin 1,05 in Nakom mite 4x 1 tbl. (na 6 ur eno tableto). Tresenja ni zaznal, prav tako ne motenj voja. Zazna blago upočasnjeno prstov levce. Pred kratkim je bil operiran zaradi tumorja mehurja.

NEVROLOŠKI PREGLED:

Klinično je govorica blago monotona, vendar glasna in razumljiva (UPDRS 1). Med petjem ni zaznati sprememb v jakosti glasu. Gibljivost zrkla je primerna. Mišični tonus je prej nižji kot normalen. Spretni gibi prstov rok so hitri ampak nižjih amplitud (UPDRS 1-2). Tonus vratnih mišic je povečan. Blaga upočasnjeno gibov levega stopala. S stola vstane le s pomočjo. Med hojo s hojico je močno sključen – kamptokomija

MNENJE:

Tudi pri današnjem pregledu ugotovim znake aksialne prizadetosti v sklopu ekstrapiramidne bolezni. Prevladujejo znaki kamptokomije, ki je posledica osnovne bolezni kot tudi hudih degenerativnih sprememb hrbtenice. Znaki bradikineze levce so blagi. Med hojo prihaja včasih do krajših blokad, ki jih ob uporabi hojice ne zazna.

V terapiji priporočam zmanjšati odmere Mirapexina na ½ tbl in na to po enem tednu prenehati z jemanjem zdravila. Priporočam povečati odmere Nakom mite na 4 x 1, 1/2 tbl.
Dne 04.01.2022 ima načrtovano rehabilitacijo v Zrečah.

Prof. dr. Miro Denišlić,
specialist nevrolog

Prof. dr. MIRO DENIŠLIĆ
specialist nevrolog